


# Vacunas recomendadas para los niños: del nacimiento a los 6 años de edad

Vacuna	nacimiento	meses									años		
		1	2	3	6	12	15	18	24	4	5	6	
Varicela						1. <sup>a</sup>					2. <sup>a</sup>		
DTaP (difteria)			1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>		4. <sup>a</sup>				5. <sup>a</sup>		
Hib (tipo de influenza)			1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>							
Hepatitis A						1. <sup>a</sup> y 2. <sup>a</sup> (al menos 6 meses de diferencia)							
Hepatitis B	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>			3. <sup>a</sup>								
Influenza (gripe)					Anual								
MMR (sarampión, paperas, rubéola)						1. <sup>a</sup>					2. <sup>a</sup>		
Contra el neumococo (PCV)			1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>							
Polio (IPV)			1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>						4. <sup>a</sup>		
Rotavirus (RV)			1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>								

 Recomendada en la edad requerida