

# اللقاحات الموصى بها للمراهقين 7-18 سنة

يبين لك المخطط أدناه متى يتوجب على طفلك تلقي لقاحاته. أشر على المربعات  لمساعدتك في المتابعة.

تاريخ الميلاد:

اسم الطفل:

اللقاح	7-8 سنوات	9-10 سنوات	11-12 سنة	13-15 سنة	16-18 سنة
الرشح (الانفلونزا) سنويًا	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VPH (فيروس الورم الحليمي البشري)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(خمسة أشهر على الأقل بين جرعة وأخرى)
المكورات السحائية YWCAneM			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	معززة <input type="checkbox"/>
المكورات السحائية BneM					
المكورات الرئوية					
PadT (الكزاز والخناق والسعال الديكي)			<input type="checkbox"/>		
التهاب الكبد فئة آ					
التهاب الكبد فئة ب					
RMM (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)					
شلل الأطفال					
الجدري (الحماق)					

يؤخذ في حال عدم أخذه سابقا

يوصى به للمراهقين المعرضين لخطر الإصابة

يوصى به حسب السن

يمكنك الحصول على ذلك بلغات أخرى، أو بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل أو أية صيغة تفضلها. كما بإمكانك طلب حضور مترجم. إن هذه المساعدة مجانية. اتصل بالرقم 800-224-4840 أو 711 للمبرقة الكاتبة TTY. نستقبل المكالمات المحولة.